



COLTURA	AVVERSITÀ	PRODOTTO	DOSE
Melo, Pero	Ticchiolatura	AGRITON® 66 DF	80-100
	Carpocapsa	MICROPIR®	250-300
Pesco, Drupacee	Oidio	GRIP® 25	30-40
	Oidio	GLAROS®	200
Melo	Miglioramento forma frutti	PROFILE®	70-100
Pesco	Cydia, Anarsia	KHELMIT®	20-25
Agrumi	Cocciniglie, Aleurodidi	RASCAL®	100-150
Nocciolo	Cimici	EGAN®	50
Melo, Pero, Agrumi	Ragno rosso	OMITE® 30 PB + AGRISTOP®	150 + 30
	Diserbo interfila	GLIFO-POP® S	3,5-5 l/ha
Vite	Peronospora	CUPROFOLPET® BLEU	300
	Oidio	MATADOR®	30-35
	Tignole	MICROPIR® o KESHET® EW	240 (250)
	Flavescenza dorata	RASCAL®	80-100
	Ragno rosso e giallo	OMITE® 30 PB + AGRISTOP®	200 + 30
	Cocciniglie	RASCAL® o MICROPIR®	100 (240)
	Miglioramento grappolo	GI-TRE®	2-4 cp/hl
	Diserbo interfila	GLIFOGOLD® + OXYFEN®	6-8 + 2-3
Pomodoro	Phytophthora	BRIONIL® COMBI	250-280
Patata	Phytophthora, Alternaria	BRAVO®	2,5-3 l/ha
Ortaggi in genere	Rhizoctonia	GAVELAN®	20 ml/m <sup>2</sup>
	Pytium, peronospora	PROMAG®	2,5 l/ha
	Sclerotinie	ALLISAN® AGRI 5F	150-200
	Afidi ecc. pre-raccolta	CINEROL® o NIMBO®	100 (500)
	Afidi, Tripidi	KESHET® EW o EGAN®	250 (100)
	Mosche minatrici	SALIGAR®	30-40
	Aleurodidi	RASCAL®	100
	Diserbo graminicida	MELTEMI	1,5-2 l/ha
Ortaggi pre-trapianto	Pytium, Phytophthorae	TERRAZOLE® 25 EC	4 l/ha
	Diserbo residuale	AGROTAL®	8-10 kg/ha
Solanacee, fragola	Botrytis	GAVELAN®	200-300
Solanacee	Ragnetti rossi, Eriofidi	OMITE® 30 PB	150-200
Solanacee, insalate pre-trap.	Diserbo residuale	KRASSIN®	2 l/ha
Frumento	Afidi	KESHET® EW	2 l/ha
Mais	Piralide	KESHET® EW	
Barbabietola da zucchero	Cleono, Lisso	KESHET® EW o MICROPIR®	
Soja	Cimici varie	THITAN®	1,4 l/ha
Medica	Apion, Coleotteri vari	CINEROL®	80
Colza	Sclerotinia	GAVELAN®	2 l/ha
Riso	Diserbo-post	LIVAS®	100
Incolti, ripe di fossi e canali	Diserbo	GLIFO-POP® S	6-9 l/ha
Rosa, ornamentali	Oidio	BASF®-MEHLTAUMITTEL	150-200
	Ragno rosso	FLORAMITE® 240 SC	40
Floreali in genere	Botrytis, Alternarie	GAVELAN®	200-300
	Afidi, Tripidi	KESHET® EW	250-300
	Larve di nottue	MICROPIR®	220
Tappeti erbosi	Fusariosi	FUGRAN®	5 l/ha
Vivai piante legnose	Cocciniglie	RASCAL®	200
Vivai piante ornamentali	Diserbo residuale	ANEMOS®	500 g/ha

Pero, Pesco, Kiwi, Agrumi	Clorosi ferrica (fogliare)	IRON® 11 MS	40-80 g/hl
	Correzioni microcarenze	MICROD'OR®	200-250 g/hl
		AMIND'OR® PLUS	200-300 g/hl
Pero	Brusone fisiologico	AMIND'OR®/AMIND'OR® PLUS	400-500 g/hl
Vite	Miglior fioritura ed allegagione	BORID'OR® + ALGAD'OR®	100-150 g/hl + 100-200 g/hl
	Correzioni microcarenze	MICROD'OR®	200-350 g/hl
Pomodoro, Melone, Cocomero, Ortaggi in genere	Miglior fioritura ed allegagione	BORID'OR® + ALGAD'OR®	1-1,5 kg/ha
	Miglior sviluppo vegetativo, incremento pezzatura	AMIND'OR® PLUS	4-5 kg/ha
	Calcio carenza	CALCI'OR® SPEED	2-3 kg/ha
Colture estensive industriali	Miglior attività fotosintetica	END'OR®	5-30 l/ha

N.B. Per contrastare l'effetto negativo del Sodio:

CALCI'OR® AKTIV

vedi etichetta

N.B. Per acidificare e veicolare le soluzioni:

ACID'OR®

50-80 ml/hl

\* Note: Salvo diversa annotazione, le dosi sono espresse in grammi o millilitri per ettolitro d'acqua. Le indicazioni della presente tabella sono riportate in modo sintetico. Per più dettagliate informazioni, richiedere ad Agrimport le etichette dei singoli prodotti. Per ogni ulteriore dettaglio sull'utilizzo dei prodotti: Responsabile Ufficio Tecnico Fitofarmaci Dr. Giovanni Miglio (giovanni.miglio@agrimport.it) - Responsabile Ufficio Tecnico Fertilizzanti Dario Sivieri (dario.sivieri@agrimport.it).